

# BCG接種後の注意事項

(乳 児)

## 《BCG接種後の注意》

- ★BCGを接種した日は、お風呂に入ってもかまいません。接種部位をもんだり、こすったり、ひっかいたりしないようにして下さい。
- ★BCGを接種した日は、接種部位に直射日光が当たらないようにして下さい。
- ★BCGを接種した後、接種部位を7日くらい毎日観察して下さい。

## 《通常の接種部位の変化》

- ★BCG接種後しばらくはほとんど変化が見られません。10日～2週間すると、針のあとに一致した赤いポツポツが現れます。3週間後、針痕の反応はだんだんと強くなり、腫れと周囲の赤みが強くなります。6週間頃に、反応がもっとも強くなり、針痕には膿がたまることもあります。2カ月を過ぎると反応はおさまってきて、3～4カ月頃にはかさぶたもとれ、瘢痕を残すだけになります。接種部位のかさぶたがとれるまでは、もんだり、こすったり、ひっかいたりしないでその場所を清潔に保ちましょう。



接種後10日頃



接種後3週間頃



接種後6週間頃



接種後4ヵ月頃

- ※ 接種部位の反応には個人差がありますので、写真のような経過になるとはかぎりませんが心配いりません。

## 《接種後7日以内に接種部位の強い発赤、腫れ、化膿がみられた場合》



- ★接種後1、2日後に強い赤みや腫れ、場合によってはうみが見られることがあります。多くの場合6、7日後にはおさまる心配はいりません。6、7日後まで様子を見て、もし、強い赤みや腫れ、うみがおさまらない場合には下記にご連絡ください。

### 接種後7日

接種後翌日から発赤、腫れがはじまった例です。

(このような反応が見られた場合、診察の参考にいたしますので、お手持ちのカメラ付携帯電話やデジタルカメラ等で撮影をお願いいたします。)

- ※ 接種後、6週間頃に上の写真のような反応は、通常の反応ですので心配いりません。

- ★わきの下のリンパ節が腫れた場合、その他ご心配な点がございましたら下記にご連絡下さい。

公益財団法人結核予防会発行「現場で役に立つ直接BCG接種の手引き」より転載。(写真)

## 連絡先 公益財団法人宮城県結核予防会

健康相談所 興生館  
仙台市青葉区宮町1-1-5 TEL: 022-221-4461  
月曜日～金曜日(祝日を除く) 8:30～17:00  
E-mail: kokan@jata-miyagi.org



複十字健診センター  
仙台市青葉区中山吉成2-3-1  
TEL: 022-719-5161  
E-mail: kan@jata-miyagi.org

